

• •

:

•

•

)

.(

•

•

•

. ( )

.

. :

. :

.( ) :

. :

. :

. :

. :

. :

. :

) ( ) :

.( ) ( ) (

( ) ( ) ( ) :

.

. :

. :

. :

( ) :

.

( ) ( ) :  
.( ) ( ) ( )

( ) ( ) :  
.( ) ( )

.( ) ( ) :

. :

. :

. :

.( ) :

.( ) :

.( ) :

.( ) :

. :

( ) :

.

. :

. :

.( ) :

.( ) :

. :

. :

. :

.( ) :

. :

.( ) :

. :

. :

. :

. :

. :

محل	عده نخل	محصول (من)	قيمه (تومان)
خوزستان (آبادان، عمره و سواحل کارون)	۵۲۳۰۰۰۰	۱۸۰۲۳۸۰۸۰۰	۱۱۱۷۲۰۳۳۵
هریزه	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۰۰۰۰۰	۶۷۵۰۰۰۰
فلاحیه	۴۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰
شوشتر	۱۱۱۹۰	—	۲۰۰۰۰
فارس (کازرون)	۶۰۳۵۱	۱۱۰۶۷۸	۴۰۳۳۵
دشتی و دشتستان	۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۳۲۱۰۰۰۰
فسا و داراب	۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
چهرم	۵۷۰۷۴۲	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰۰
بهبهان	۱۵۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰
عباسی و میناب	۱۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۰۰۰۰۰۰
مریخی بلس (گلستان) و لنگرک	۵۰۰۰۰	۲۷۵۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰
کرمان و بویراحمد (شیخ)	۲۲۰۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰
یم	۸۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰
جیرفت	۴۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰
رودبار	۴۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰
ارژویه	۱۴۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰	۱۶۲۰۰۰۰۰
جمع کل	۱۲۰۰۸۶۰۴۸۷	۶۲۰۴۲۵۰۴۶۸	۶۵۰۵۱۹۰۴۹۰

( )



...

( )

( )

( )

پی نوشت:

۱ - طرز کاشتن زعفران - در خرداد ماه پیاز زعفران را از زمین بیرون می آورند و تا شهریور ماه در محلی که آفتاب نداشته باشد نگاه می دارند در اول شهریور پیازها را در زمینی که ۲۵ سانتیمتر عمق شیار داشته باشد بفاصله های ده سانتیمتر می نشانند (از اول شهریور تا نیمه ابان موقع زعفران است) در آذرماه بزمین کود می دهند و شروع به آبیاری می نمایند و تا اول فروردین سال دوم سه مرتبه آب یاری کفایت می کند از اول فروردین سال دوم الی اول مهرماه برای زمین مزروع آب و کودی لازم نیست و فقط باید مهرماه سال دوم مقداری کود و بعد از آن آب بدهند پس از آب یاری زمین را باید مجدداً بقسمی شیار نمایند که ضرری به پیازهای کاشته شده وارد نشود در بیستم مهرماه سال دوم مقدار قلیلی گل می دهد و آبیاری در این سال تا اول فروردین هر دوازده روز یک مرتبه است، در سالهای بعد طرز شیار و کود و آبیاری تا ده سال مثل سال دوم است (در بعضی اراضی تا پانزده سال هم عمل می کنند) برداشت محصول زعفران از سال چهارم تا سال دهم است و از آن بعد محصول آن روی بنقصان می گذارد، در سال پانزدهم پیاز را از زمین خارج کرده و بترتیب فوق بزمین جدید انتقال می دهند، چیدن گل زعفران باید قبل از طلوع آفتاب تمام شود و در هر سال قریب بیست روز از پانزدهم مهر تا پنجم ابان همه روزه چیدن گل شروع و قبل از طلوع آفتاب ختم می شود.

ii- *Antonomus Grandis*.

iii- *Pectinephora Grossypiella*